

Interrupción Voluntaria del Embarazo ***IVE***

Ley 18.987

El uso de medicamentos (mifepristona seguida de misoprostol) es el método recomendado para la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas

Indicaciones:

Tomar **1** comprimido de **MIFEPRISTONA**
(200mg) con agua

36 horas después colocar


4 comprimidos de

MISOPROSTOL

(200mcg cada una) por vía bucal

(2 tabletas de un lado y 2 del otro, entre el cachete y la encía)

Después de 30 minutos tragar con agua los restos



Interrupción Voluntaria del Embarazo

IVE

EFFECTOS ESPERADOS:

Sangrado

Dolor, cólicos (puede usar Ibuprofeno)

Diarrea, náuseas, vómitos

Escalofríos, fiebre

RIESGOS - situaciones ante las cuales debe consultar en forma urgente:

-Las anteriores, si así lo considera la mujer

-Sangrado excesivo: sangrado que empape dos toallas higiénicas por hora durante más de dos horas seguidas.

Sangrado intenso y repentino que se reinicia luego de varios días con poco o sin sangrado.

Sangrado continuo durante varias semanas con mareos.

-Feo olor en el sangrado

-Chuchos de frío o fiebre que se presenta luego de 24 horas (1 día) de haber usado la medicación.

-Falta de aire o fatiga

Estos efectos son muy poco frecuentes

Es importante consultar a los 7 a 10 días luego de la interrupción