



apoyo  
psicológico

## ES IMPORTANTE QUE SEPAS

QUE PUEDES CONTAR CON EL  
ACOMPANAMIENTO  
PSICOLÓGICO PARA  
TRANSITAR ESTA SITUACIÓN  
QUE ESTÁS VIVIENDO CON  
MAYOR SEGURIDAD Y  
CONFIANZA



consulta  
programada  
a los 10 días

### FECHA DE LA CONSULTA

**ES MUY IMPORTANTE QUE  
CONCURRAS A LA CONSULTA  
PROGRAMADA, EXISTA O NO  
SINTOMATOLOGÍA**

PARA EVITAR UN EMBARAZO,  
NO DESEADO, LA ANTICONCEPCION  
ES LA FORMA DE LOGRARLO

Cuentas con anticoncepción  
en todos los Servicios  
de Salud del país



recuerda que...

- debes realizar una consulta a la brevedad
- si no ocurre la expulsión prevista
- o si adviertes un escaso efecto de la medicación
- o si tienes dudas

**Línea aborto  
información segura  
0800 8843**



efectos ante los  
cuales debes consultar  
en forma urgente

Ante cualquier síntoma que  
consideres

- Sangrado excesivo:**
  - a) sangrado que empape 2 toallas higiénicas por hora durante más de 2 horas seguidas.
  - b) sangrado intenso y repentino que se reinicia luego de varios días de escaso o nulo sangrado.
  - c) sangrado continuo durante varias semanas con mareos.
- Feo olor en el sangrado
- Chuchos de frío o fiebre que se presente luego de 24 horas de haber usado el Misoprostol
- Falta de aire o fatiga

línea gratuita, confidencial  
y de alcance Nacional

# 0800 3131

SIDA - SEXUALIDAD - DERECHOS  
Desde tu Ancel \*3131  
Una pregunta, una respuesta



# POST IVE

Recomendaciones



es muy importante que comiences a usar un método anticonceptivo lo antes posible, ya que la fertilidad se recupera rápidamente

Cuándo comenzar anticoncepción luego de abortar	Método	Duración de Protección Anticonceptivo					Efectividad	
		1 vez	1 mes	3 años	5 años	10 años		Permanente
Reversible pueden empezar con la primera tableta de mifepristona	Condomes	↑						85%
	Pastillas	↑	↑					92%
	Inyecciones	↑	↑					97%
Reversible largo plazo Estos métodos anticonceptivos se pueden empezar cuando el aborto es completo	Implantes	↑	↑	↑	↑			99,9%
	DIU	↑	↑	↑	↑	↑		99,2%
Permanente Estos métodos anticonceptivos se pueden empezar cuando el aborto es completo	Ligadura						↑	99,5%
	Vasectomía						↑	99,8%